

داروهای ضد افسردگی

افسردگی به علت کاهش فعالیت بعضی از مواد شیمیایی موجود در مغز ایجاد می شود و داروهای ضد افسردگی این مشکل را در مغز اصلاح می کنند.



داروهای ضد افسردگی مانند :

آمی تریپتیلین
نورتریپتیلین
ایمی پرامین
سیتالوپرام
بوپروپیون و...

این داروها عوارض زیر را ایجاد می نمایند:
یبوست، خشکی دهان، تاری دید و...

دسته بندی دارویی

داروهای مورد استفاده در درمان بیماریهای اعصاب و روان به چند گروه اصلی تقسیم می شوند این تقسیم بندی شامل موارد زیر می باشد:

➤ داروهای ضد افسردگی


➤ داروهای ضد اضطراب

➤ داروهای تنظیم کننده خلق



بیمارستان تخصصی شهید رجایی

آشنایی با داروهای روانپزشکی



تهیه و تنظیم : فرزانه بهرامی
(مسئول آموزش سلامت همگانی)

بازنگری اول _ بهار ۱۴۰۲

کد پمفلت : RH.PM۱.S۶

سایر داروهای روانپزشکی

✓ کلوزاپین :

اگر طی درمان با این دارو دچار هرگونه عفونت ، ضعف ، تب ، گلودرد شدید به پزشک معالج خود مراجعه کنید.

لازم است ماهانه آزمایش خون . انجام دهید و جواب را به اطلاع پزشک معالج برسانید.

✓ لارگاکتیل :

این دارو ممکن است باعث کاهش فشار خون شود به همین دلیل قبل از مصرف باید حتما فشارخون چک شود و در صورت پایین بودن فشارخون با احتیاط مصرف شود.

✓ هالوپریدول :

در بیماری هایی مانند اسکیزوفرنی و دوقطبی بکار می رود. مصرف این دارو در بعضی بیماران باعث گرفتگی عضلات میشود که به صورت کج شدن و سفتی عضلات گردن ظاهر میشود . این دارو میتواند به همراه غذا یا با معده خالی مصرف شود.

داروهای تثبیت کننده خلق

۱. لیتیوم:

در درمان بیماری دو قطبی به کار میرود.

اگر طی درمان با قرص لیتیوم دچار علائم :

لرزش دست ، عدم تعادل ، تشنج و تهوع استفراغ و اسهال و خشکی دهان و افزایش میزان ادرار و تشنگی شدید، مصرف لیتیوم را قطع کرده و فوراً به پزشک خود اطلاع دهید .

در طول درمان با قرص لیتیوم فرد باید آب و نمک به اندازه کافی مصرف کند.

۲. والپروات سدیم یا رهاکین :

علاوه بر بیماری دو قطبی در درمان تشنج و میگرن کاربرد دارد.

افزایش وزن از عوارض این دارو می باشد.

۳. کاربامازپین :

از این دارو برای درمان تشنج و مشکلات خلقی استفاده میشود. جهت جلوگیری از عوارض گوارشی بهتر است این دارو همراه با غذا مصرف شود .

باعث خواب آلودگی و سرگیجه میشود به همین دلیل در موقع رانندگی باید با احتیاط استفاده کرد.

داروهای ضد اضطراب

این دارو ها برای درمان اضطراب و بی خوابی استفاده می شوند.

قطع ناگهانی این داروها باعث شدید تر شدن علائم بیماری میشود.

مهمترین عارضه این داروها خواب آلودگی میباشد.

داروهای ضد اضطراب شایع شامل : دیازپام،

اکسازپام ، لورازپام، کلونازپام، آلپرازولام و کلر دیازپوکساید می باشند.

دیازپام در درمان تشنج نیز استفاده می شود.

